

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2012

Εμβόλιο	Ηλικία	19-26 ετών	27-49 ετών	50-59 ετών	60-64 ετών	≥ 65 ετών
Γρίπης						1 δόση ετησίως
Τετάνου, Διφθερίτιδας, Κοκκύτη (Td, TdαP)	Αντικατάσταση μιας δόσης Td με TdαP (ή TdαP-IPV αν δεν υπάρχει) και στη συνέχεια 1 δόση Td ανά 10ετία				1 δόση Td ανά 10ετία	
Ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς (MMR)					2 δόσεις	
Ανεμευλογιάς					2 δόσεις	
Ιού ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV)	3 δόσεις για γυναίκες					
Πνευμονιοκόκκου (PCV13)				1 δόση PCV13		
Πνευμονιοκόκκου (PPSV)	1 ή 2 δόσεις					
Μηνιγγιτιδοκόκκου (MnCV4)					1 ή περισσότερες δόσεις	
Ηπατίτιδας Α					2 δόσεις	
Ηπατίτιδας Β					3 δόσεις	
Έρπητα Ζωστήρα					1 δόση	
Γρίπης		1 δόση ετησίως				

Δεν συστίνονται

Συστίνονται σε άτομα που καθυστέρησαν να εμβολιαστούν ή που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου π.χ. λόγω υγείας, επαγγέλματος, τρόπου ζωής ή άλλης ένδειξης. (βλ. Ομάδες Αυξημένου Κινδύνου και Πίνακα 5 με τις επεξηγήσεις)

Συστίνονται για όλα τα άτομα με την ανάλογη πλικία που δεν έχουν ένδειξη ανοσίας. Δηλαδή προηγούμεντα εμβολιασμό ή προηγηθείσα φυσική νόσοση.