


Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 2012

Εμβόλιο	Ηλικία	Γέννηση	1 μηνός	2 μηνών	4 μηνών	6 μηνών	12 μηνών	15 μηνών	18 μηνών	19-23 μηνών	2-3 ετών	4-6 ετών	11-12 ετών	13-18 ετών
Ηπατίτιδας Β (γέννηση)		HepB	HepB			HepB			HepB					
HepB για παιδιά που δεν εμβολιάζονται στη γέννηση				HepB	HepB	HepB (σύνολο 3 δόσεις)								
Διφθερίτιδας, Τετάνου ακυτταρικό Κοκκίτου				DTaP	DTaP	DTaP		DTaP				DTaP	Tdap-IPV	
Αιμόφιλου Ινφλουέντζας Β				Hib	Hib	Hib	Hib		Hib					
Πολιομυελίτιδας αδρανοποιημένο (IPV)				IPV	IPV	IPV					IPV			
Πνευμονιόκοκκου				PCV	PCV	PCV	PCV				PCV13†			
Μηνιγγιτιδόκοκκου				MCC	MCC	MCC						MCV4		
Ιλαράς, Ερυθράς, Παρωτίτιδας							MMR					MMR	MMR	
Ανεμυελογιάς							Ανεμ/γιάς					Ανεμ/γιάς		
Ηπατίτιδας Α							Ηπατίτιδα Α (2 δόσεις)			Ηπατίτιδα Α				
Ιού ανθρωπίνων θηλωμάτων													HPV	
BCG		BCG					Mantoux					(Mantoux) BCG	Mantoux	
Γρίπης						Ετησίως σε ομάδες υψηλού κινδύνου								
Ροταϊού				Rota	Rota	Rota								

*Τα πολυδύναμα εμβόλια πρέπει να προτιμώνται των ολιγοδύναμων ** Τα εμβόλια κάτω από τη διακεκομμένη γραμμή είναι συνιστώμενα και όχι απαραίτητα †μόνο για παιδιά που εμβολιάστηκαν με PCV-7 ή PCV-10

 Δεν συστήνεται

 Συστήνονται σε άτομα που καθυστέρησαν να εμβολιαστούν ή που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου π.χ. λόγω υγείας, επαγγέλματος, τρόπου ζωής ή άλλης ένδειξης. (βλ. Ομάδες Αυξημένου Κινδύνου και Πίνακες 2 & 3 με τις επεξηγήσεις τους)

 Συστήνονται για όλα τα άτομα με την ανάλογη ηλικία που δεν έχουν ένδειξη ανοσίας. Δηλαδή προηγηθέντα εμβολιασμό ή προηγηθείσα φυσική νόσηση.